

Подбълз, *Tussilago farfara* L.¹⁾.

Зарасличе, черно коренче, *Symphytum officinale* L. За тѣзи трѣва разказватъ, че имала толкова голѣма церителна сила, щото ако се тури листа ѝ и между два здрави прѣста, то тѣ ще зарастѣтъ въ едно²⁾.

Ранилистъ, *Stachys betonica* Benth.

Кравешка цуса, *Sedum telefium* L. Листята отъ тѣзи трѣва се налагатъ върху разни видове отоци за да размахне „да удари на дурѣ“. За сѣщата цѣль се употребяватъ и листята отъ:

Щавлъкъ, *Rumex sanguineus* L., *k. obtusifolius* L.³⁾, *k. pratensis* и *k. crispus* L.

Перуника, *Iris germanica* L. Кореня ѝ се вари въ млѣко и се налага на разни видове рани и отоци.

Чернъ разводникъ, кучо гроздѣ, *Solanum nigrum* L. и

Трѣва отъ прищъ, *Prunella vulgaris* L. и двѣтъ тѣзи трѣви се налагатъ така сѣщо върху разни видове рани и отоци, а особно послѣдната се налага върху отокътъ извѣстенъ подъ име лошата или черната пришка (*Carbunculus*)⁴⁾?

Прозориче или яречъ, *Sedum acre* L. Съ тѣзи билка кѣпѣтъ дѣца, които сѣ толкозъ недѣгави и заслабѣли, щото имъ се прозиратъ отъ слабостъ ушитѣ⁵⁾.

Трѣва отъ очи, *Euphrasia officinalis* L. Съ тая трѣва лѣкуватъ разни видове очни болѣсти⁶⁾.

Врани око, (гареа бименъ), *Strychnos nux vomica* L. Съ мената отъ това чуждестрано отровно растение, купуватъ

1) Глѣдай забѣлѣжка 3 (стр. 27).

2) Корена съдържа, тлъстено, смолисто и дѣбилно вещество и слѣзъ. Той влиза въ *massa pillularum et cynoglossa*.

3) Корена отъ това растение съдържа румицинтъ, смола, дѣбилно вещество крахмалъ и слѣзъ. Употрѣбява се одварка вътрѣшно и външно.

4) *Herba prunella* се е употребявала ерѣщу ангина и ерѣщу диарреята като одварка.

5) Тая трѣва се е употребявала като пикочено-гонно и противо цинготно ерѣдство.

6) Съдържа етерно масло, дѣбилно, горчиво и цвѣтено вещество. Отъ прѣсната трѣва се получавали *aqua euphrasii*, и употребявали като примочка за очи.

(Редакцията).