Тѣхъ сѫ тревисти растенія, разсѣяни по сѫщіятѣ земни мѣстѣ, имать гъмелести цвѣтове и перца сѣмо у на кръгъ, отъ хлѣбно сѫ получили името; листайки ти сѫ сѫ, отъ кои то 2 тасѫ покрити, плодъ имъ е двурнедна тиква въ коѫ сѫ разположени сѣмцата или въ обтъ или въ два реда. Тыкви-тѣ и сичкити кръстоцвѣтни имать въ стъблата си въ листата и въ корѣнити листи мѣрзлива вещества, затова употрѣбяватъ за чѣрѣ кръстово тѣсто (!) въ всѣмѣта си имать масло. Тыкъ сѫ отпадѫтъ отъ 1600 различни видове отъ тѣзи растенія отъ тѣхъ по известни сѫ:

Р. Зелѣ Cabbage многогодишно растеніе кое то вѣрѣ лесно сѫ хвана, користи се му сѫ употрѣбяватъ за подправа и за грозде-ницѫ.

Р. Блатенка, Banda, дава Isatis tinctoria

жѣлта сѫща боя, за кою въ много мѣста я-вадѫтъ, въ нѣкои мѣста расте и дива.

Растителностъ зелѣ едно отъ Brassica

най полѣзни ти и най потрѣбити заголовѣ-ки растенія. Тѣсто и кисло е главна-та проста и постна храна на народа. Сва-по нѣгдѣ сѣ сѣютъ, кое е тъй сѫщо вку-сно, както и чрѣсно-то. Зелѣ то расте диво по брѣговѣти на Германія, Англія, и Франція отъ искуство-то обработване извѣстни сѫ много разновидности: Бѣло, Червено, Сене-кѣдерово Полевнисѫ, морско-лѣко, свѣжо-сѣко и др. отъ тѣзи родъ е глоглѣжа (Алабата) Кѣрнабѫдъ и др.

Р. Синапъ Бѣлъ и черъ, видоѫ дивъ но Sinapis albaet nigra

сѫтъ употрѣбяватъ за подправа, за грозде-ница, вадятъ отъ сѣмѣто му масло кое мото.

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА