Р. Черници (Morus), растатъ се на бъла и черн. Кълъ това сливково принадлежатъ и сладко дърво, на кое зрелата се като тиква, и като се обелятъ ималъ хубавъ вкусъ, казватъ, че при нас ся от въ Хаити с зрелатъ алеговъ плодъ. Това растение се разпространява всякъде о-ви на горѣ 0 м.—

Семейс. Обикновени (Amentaceae)

Това сем. си е получило името отъ разположение то на цвѣта, който е като обвит. Тѣзи дървета и тревисти на умѣренитѣ страни корени тѣ имъ се дълбоко въ земя та задържат и предпазват да не се изтрие. Тѣзи растения тѣ дава дрва за горене за кестене, а тѣ имъ кора кой се дърпа въ себе си много дебелина кисела, употребява се за оцветяване кожи тѣхъ цвѣтенъ твърдо рано, и преди отъ тѣхъ до годинъ пъпка тѣ имъ по напредъ цвѣтатъ. Мъжкитѣ тѣ имъ се цвѣтове се обикнѣти, а плодниковитѣ сладкови, или тѣ сѣщо обикнѣти. Чистой решение се мъжкитѣ и плодниковитѣ цвѣтове се намѣрватъ на сѣщото дърво, колкото на дрѣвъ, орѣха, лешника и дъба; и у нѣкой, колкото на пр. бардата и тополата са двѣти. Плодовѣтѣ тѣ имъ се твърдо различни; на дъба жѣлъдъ, на бреза — крилатко, на бардата чунка, на черницата бубонка, на лешника лешникъ. Семейството е раздѣлено на нѣколко отдѣли, колкото: вербови, березови, дъбови, и лещерови. Тѣй ще ги разглеждаме заедно, подредно общо име: обикнѣно.

Р. Бреста (Ulmus), достигне отъ 80-100 м. височина и до 3 м. въ діаметра. Стволъ за разлики потредни, за мавини за обелени и пр. Имъ нѣкъ се отпада и голѣмъ дрѣвъ (Ulmus campestris) Cuberes) пуща не мѣдни и клонове брат. Тово дерво расте твърдо голѣмо.