Инв № 509
ЛИТЕРАТУРЕН ИНСТИТУТ
Ф. № 1
ИНВ. № 179

Мъхове-тъ са най-първи-те растения, които заливат да покриват на твърдата още неплодна земя, и тъ са пак последни-те единици растения, които изоставят растящо-то растение най-голяма-та степен на изсушаване и остават сами-те да растат. Затова линей е казал за тях че тъ са алфа и омега (начало и край) на растително-то царство. Твърде много от тези мъхове се ползуват на гобята или за изтръ, или за храна на добитъка, или за напъване на постелки и др. т. Спорт. Това са разделени на 2 разряда: 1. Дрободенни мъхове, които се употребяват за изтръвване на черни-те дробове и 2. Обикновени мъхове, които бивали много различни. Много-то наръчни мъхове се хранят в бъреки вълнища, на напъване и прецеждане много блата и др. води. По забележителни-те от мъхове-те са:

1) Тамарисови мъх (Hypnum tamariscinum Hedw.) расе по горни-те на цяла европа. Твърде от тоза род мъхове бивали дълги до 3–4 пръста.

2). Мъховина обикновена (Polytrichum commune Hedw.) твърде много бива и колко-то една стъпка дълга и на вътра се цяла остра мъгреда. Той е най-голяма-та от пухкави-те мъхове.

3). Многозвареен дрободенен мъх (Marchantia polymorpha L.) расе покрай изворите и бари-те по влажни-те земи и вълнища, употребяват се е за лъка на черния дроб; зарастя и нарича дрободенен.

Б. Цъвтящи Спорови растения.

Тези растения, макар и да нямат цвяти, какъвто цвятни-те растения, но пак имат очевидни семена, листа, корени и правени корени. Цвяти-те са в тъвни-те семена а особно в тъвни-те листа се наместват отвъд малки всякоразни цвяти, които се отличават от всякакви-те растения, затова се нарича цъвтящи спорови раст.