Вилвено се спинена, нъ са развиват
са едни праговни спори, които са натрупа
въ особни отъгъстема на мѣзѣта или
въ падъка изъ твърду сила и слабо.
(Какъ у плаунови-тѣ растения). Тука
принадлежатъ:

Кл. IV. Папрамови (Filicinae) Bisch

Тѣзи растения се съществуват
напълно въ предисторическо-тѣ времена
подъ тѣ се повече отъ тѣхъ изчезнали
най напълно папрами-тѣ бивали
въ горнината сграми като дървета
голѣми, които образуваме и цѣли гори
въ средни-тѣ и умѣрени-тѣ страни,
нѣ бивали само дръвни едни, или
тръвни. Листо-та на тѣзи едни
растения бивали различно перестораздѣлени
спорови-тѣ групи ~~сами~~ са разположени
отъ долни-та страна на листо-та.
Освенъ сами папрадови-тѣ растения
са умножавали за изобилни
правени отъ Кортенотѣ ~~сами~~ гирлиц
и полипод. ~~Тази клас~~ се ~~са разделя~~
~~на 3. разреда: 1) сами папрати, 2) Кортенови~~
~~расф. и 3) Плаунови расф.~~

1. ~~Сами~~ Сами папрати (Filices) Luss.

~~Отъ тоя разредъ~~ (~~са забелязани~~):

1) Орлова папрамъ (Pteris aquilina L.)
2) Мъжка папрать (Aspidium filix mas) Sw. Мъжкоцвѣтна
3). Сладка папрать (Polypodium vulgare L.
4.) Телешовъ езикъ (Scolopendium officinarum) L.
5.) Дръвовидна папрать (Alsophila L. и др.

Мурсенъ Кортенъ

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА