

По сѣщия начинъ се разсѣйватъ и семената на вишната, черешата и др. растения.


Така че много животни, като се хранятъ съ плодетѣ на нѣкои растения, разпрѣсватъ семената имъ — отдалечаватъ ги отъ майчиното растение и едни отъ други. Поникналитѣ растенійца не си оспорватъ нито храна, нито влага, нито слънчеви лъчи. Тѣ могатъ да растатъ и да се доразвиватъ.

Услугата на птицитѣ и бозайницитѣ, които сж изхвърлили семената, е още по-голѣма, като се има предъ видъ и това, че изхвърленитѣ съ животинския торъ семена намиратъ готова хранителна почва.

Докато семената не сж узрѣли, плодетѣ не само сж зелени и не се забелязватъ между листата, но иматъ и лошъ вкусъ. Когато вече семената узрѣятъ напълно, плодетѣ ставатъ ярки, вкусни и ароматични. Така тѣ привличатъ разни животни, които ставатъ разпространители на семената имъ.

*
* *

Случва се семена да попаднатъ въ калъ. Заедно съ калъта такива семена оставатъ прилепнали между прѣститѣ на животнитѣ. Като изсъхне калъта, семената опадатъ и така се засѣватъ далечъ отъ майчиното растение.



Фиг. 1. — Крилати плодове.

Семената на брѣзата, клена и брѣста иматъ тѣнки ципести израстъци — крилца. Най-слабиятъ вѣтрецъ подхваща лекитѣ крилати семена и ги отнася надалечъ. (Фиг. 1).

У глухарчето и върбата семената сж снабдени съ бѣли космици. Тѣзи космици правятъ семето по-леко, помагатъ му да се задържи повече време въ въздуха и да бже отнесено на по-далечно разстояние отъ растението, което го е създало. (Фиг. 2.)

Семената на бутрака, дивия морковъ и др. растения иматъ малки кукички. Когато минаватъ животни покрай такива растения, семената имъ се закачатъ за козината, и животнитѣ ставатъ тѣхни разпространители. (Фиг. 3).