

още еластични, разтежими и кръвното налъгане нормално, рѣдки сѫ изненадашитѣ и упорити кръвотечения изъ носа. Тѣ най-често се явяватъ при удари и падания, при чоплене или при нарастъци въ носа.

Ала когато организмътъ позастарѣе и кръвоносната система претърпи измѣнения — кръвоносните сѫдове затвърдѣятъ, станатъ по-слабо еластични и лесно чупливи, — когато и общото кръвно налъгане се повиши, пъкъ и настѫпятъ измѣнения въ бжбрецитѣ и черния дробъ, чрезъ които кръвта се пречистя и запазва нормалния си съставъ, не е рѣдко да настѫпватъ изненадащи кръвотечения изъ носа по поводъ на най-слаби усилия или дори при слабо издухване, при преумора или загрѣване.

При такива случаи, спирането на кръвотечението понѣкога е трудно и изиска на мисане на лѣкаря. Ала при обикновеното кръвотечение, когато то последва при издухване, при чоплене, при слабъ ударъ, често всѣки може да спре кръвотечението, като си послужи съ следнитѣ срѣдства:

Разкопчватъ се, разслабватъ горнитѣ и долни дрехи около шията (яка, врѣзка, риза). Разтваря се стаята за прѣсень, хладенъ въздухъ. Не се лѣга, а се остава правъ или седналъ, главата изправена. Не трѣбва да се смѣрка силно, нито да се издухва носътъ. Често едно притискане съ кърпичка или съ памукъ ноздрата, отъ която тече кръвъ, е достатъчно. Ала ако отъ това кръвотечението не спре, поставя се на челото студени компреси. Издига се нагоре ржката откъмъ кръвотечащата ноздра. Поставя се въ ноздрата топка памукъ, натопена въ кислородна вода или въ разтворъ на антибиранъ 1:10, ще рече $\frac{1}{2}$ грамъ антибиранъ въ лъжица вода.

Ако кръвотечението не спира, ами при запушване отпредъ, кръвта почва да тече изобилно презъ задния носовъ отворъ, необходимо е да се повика лѣкаръ.

У нѣкои пълнокръвни, предразположени къмъ апоплексия или у сърдцеви болни, носното кръвотечение може да е облекчаваще и не трѣбва да се бѣрза съ спирането му.

Ако кръвотечението изъ носа се повтаря често, необходимо става да се изследва болниятъ, да не би да е признакъ на нѣкакво бжбреично, чернодробно или друго артериосклерозно боледуване. Тогава, разбира се, трѣбва да се лѣкува основната болестъ, а не само единъ отъ признаките ѝ. При носогърлени нарастъци у децата, трѣбва тия нарастъци да се изрѣжатъ.