

бирането. Остава, при узрѣване на гнойното забиране, да отидете при лѣкаря и съ прорѣзване да се даде изходъ на гнойта.

Добре е това прорѣзване и поне първитѣ нѣколко превръзки да се правятъ отъ лѣкарь или отъ добре обученъ фелдшеръ, а не отъ баба и други лѣкувачи, които, съ нечистото пипане и налагане на разни мръсни мехлеми и други нечистотии — ужъ за изтегляне на гнойта — могатъ да причинятъ такива дълбоки усложнения, че да извикатъ падане или загняване на костици или стави и да последва тежко осакатяване и губене напълно работоспособность.

Дребнитѣ работи при заболѣванията — нека се помни — иматъ често сждбоносно значение за болнитѣ. Дребнитѣ работи предпазватъ отъ голѣми катастрофи. А тия дребни работи сж подадене на всички. Достатъчно е да се разбере тѣхната важность и да искаме да ги изпълнимъ.

7. Ухоболъ

Макаръ ухото, отъ всичкитѣ наши сѣтива, да е най-добре защитено — залостено въ най-твърдата частъ на черепа — то често заболѣва и дълбоко се поврежда. 25% отъ децата въ училищата нѣматъ нормаленъ слухъ. На това не се обръща достатъчно внимание и много възрастни страдатъ отъ ушитѣ си и иматъ повреденъ слухъ, поради това пренебрегване на ушнитѣ заболѣвания презъ детство.

Дълбокитѣ заболѣвания на ухото, които водятъ началото си отъ пренебрегнатъ гърлоболъ, особено при инфлуенца, или отъ пренебрегнато ушно гноетечение, изискватъ непременно и неотложно грижитѣ на специалиста лѣкарь по ушни болести. Не сж рѣдки случаитѣ, когато тия заболѣвания се усложняватъ съ гнойно възпаление на задушния издатъкъ (на черепа), и да последва гноенъ менингитъ, който може да срази болния вътре въ 2—3 дена, ако не се прибѣгне веднага до операция.

Затуй, не се отнасяйте леко къмъ заболѣванията на гърлото, а показвайте го на лѣкарь, за да се избѣгватъ усложненията. Сжщо не отлагайте да лѣкувате сериозно и систематично всѣко ушно гноетечение.

Когато се появи ухоболъ безъ никакъвъ другъ признакъ, безъ зачервяване, подуване или загрѣване на ухото (на ушното блюдо и на ушния каналъ), ухоболътъ сигурно се дължи на невралгия. Добре е при тия случаи да се капнатъ 2—3 капки карболовъ глицеринъ (взетъ отъ аптека), следъ което да се постави тампонче отъ аптекарски памукъ.