

Царицата снася яйца отъ м. февруарий до септемврий. Снася дневно 300 до 2,500 яйца; годишно — 150,000; презъ цѣлия си животъ около 500,000 яйца.

За развитието на царицата сж нуждни 16 дни: 3 дни прекарва като яйце, 6 дни — като ларва, 7 дни като какавида.

За търтея сж нуждни 24 дни: 3 дни — яйце, 6 дни — ларва и 15 дни — какавида.

За работницата — 21 дни: 3 дни — яйце, 7 дни — ларва и 11 дни — какавида.

Царицата живѣе отъ 3 до 5 години; търтеитѣ — отъ 3 до 5 месеца, а работницата — отъ 1 до 10 месеца.

Пчелитѣ хвърчатъ до 4 километра далечъ отъ кошера; въ изключителни случаи — до 6 клм.

Сѣячи на болести и смъртъ. Двама лѣкари, въ едно свое съобщение въ френската академия на наукитѣ, доказвали, че когато човѣкъ говори високо, прѣска изъ устата си слюнчени частици, които достигатъ на разстояние 30—40 см. При кашлене тѣзи частици достигатъ и до 1 м. и 50 см., а при кихане — до 3 м. и 50 см.

Тия частици сж носители на микробна зараза. Оставатъ плаващи въ въздуха въ продължение на шесть секунди. Когато болни отъ брусница, скарлатина, лошо гърло (дифтерита) и др. кашлятъ, кихатъ и силно говорятъ, могатъ да предадатъ заразата на тѣзи болести. Най-често и лесно се предаватъ по този начинъ инфлуенцата и туберкулозата.

Въ интереса на здравитѣ е, щото всѣки боленъ да свикне, кога кашля, киха или храчи, да поставя винаги кърпа или ржка предъ устата си.

