

перуда, не много голѣма, съ красиви пѣстри крилца. Преднитѣ крилца сж сиво-синкави, а заднитѣ червено-сиви. Ябълчната пеперуда хвѣрчи презъ м. май и юний и то обикновено вечерно време (нощни пеперуди). Презъ това време плодетѣ на ябълката и крушата сж вече оформени и по тѣхъ ябълчната пеперуда



№ 3 — Ябълчна пеперуда—ябълка съ червей.

снася яйчицата си. Тѣ се развиватъ въ личинки (много дребнички червейчета), които навлизатъ въ зеленитѣ още плодове. Докато плодетъ — ябълка, или круша зрѣе, вжтре живѣятъ, хранятъ се и растатъ навлѣзлитѣ червейчета. Презъ есенъта, когато заразенитѣ плодове узрѣятъ, личинкитѣ (гжсенички на ябълчната пеперуда) ги напускатъ, скриватъ се въ нѣкоя пукнатина по кората на ябълката или крушата и тукъ се превръщатъ въ малки какавиди. На идната пролѣтъ какавидитѣ се превръщатъ въ нови ябълчни (плодни) пеперуди.

Единственото спасение отъ ябълчната пеперуда и запазване на плодетѣ да не червясватъ, е грижливо да събираме преждевременно узрѣлитѣ червиви плодове и да ги унищожаваме или да ги даваме на свинетѣ за храна. Така ще се премахнатъ личинкитѣ и ще се предпазатъ плодетѣ отъ червясване.

Нашитѣ овощни дървета иматъ още много други неприятелѣ. Такива сж **крѣвната** и **щитоносна** въшки.

Крѣвната въшка е насѣкомо, което напада предимно ябълковитѣ клончета, па и самия дѣнеръ. Тя лесно се разпознава, понеже заразеното клонче е по-