

то дойността ѝ е $6\frac{3}{4}$ ($\frac{1200}{180}$). Удовлетворителна дой-

ност е 4, добра — 5, по-добра 6, твърдѣ добра 7, прѣвзходна $8\frac{1}{2}$.

Възрастта се познава до четвъртата и петя (4—5) година по жбитѣ, а подирѣ това у кравитѣ по рогата

При ражданието си телето има 4 млѣчни рѣзци а къмъ началото на втория мѣсецъ прорѣзватъ и останалитѣ четири (защото всичко сж 8) и по 3 коренни жби (кжтници) отъ всѣка страна на двѣтѣ челюсти. Около шестия мѣсецъ изниква първия постояненъ жбъ (*първия кжтникъ*), около петнадесетия мѣсецъ — втория постояненъ жбъ (втория кжтникъ), а около втората година *сръднитѣ* (първи) рѣзци се замѣняватъ съ нови или постоянни и въ това врѣме пониква и третия кжтникъ около трилесетия мѣсецъ ($2\frac{1}{2}$ год.) ввтория редъ млѣчни жби се замѣняватъ съ изникване нови и постоянни; около третата — третия редъ млѣчни жби се замѣняватъ съ нови и постоянни, а четвъртия (последенъ) редъ жби се замѣняватъ въ $3\frac{1}{2}$ годишна възраст. А къмъ четвъртата година животътъ ното има всичкитѣ си жби постоянни.

Възрастта на кравата се познава порогата на това основание, че при всѣко раждане на рогата ѝ при основата се отлага *търкалце* (кржжилце). Колко кржжилца има на рога еи, толкова пжти е раждала кравата или толкова години е раждала; като се прибавятъ 2 години къмъ числата на кржжилцата по рогата, ще се получатъ годинитѣ на кравата отъ нейното рождение; къмъ тѣхъ 2 се прибавятъ, защото обикновено отъ двѣгодишна възраст захващатъ кравитѣ (телици) да се телятъ а рѣдко отъ $2\frac{1}{2}$ год. Ако нѣкоя година кравата е останяла ялова, то междината на тия кржжила бива по широина и за тѣзи широчина трѣба да се прибавя една година къмъ годинитѣ отъ кржжилцата.

Г-да д-ритѣ И. П. Любеновъ и Т. Коппъ сж превели, а книжарницата на Ив. Б. Касжровъ въ София издала, съчинението на Ерн. Брюкке, професоръ по физиологията въ Виенский университетъ, какъ да се запази живота и здра-