

грудныхъ дѣтей уже съ самаго рожденія цѣльнымъ коровьимъ молокомъ, а чтобы посытѣе было — варятъ еще гречневую кашу на молокѣ. Состоятельные крестьяне вмѣсто гречневой каши — употребляютъ манную кашу. Часто даютъ еще соску (булку съ сахаромъ). Молоко даютъ изъ рогового рожка, обтянутаго овечьей кожей, снимающеюся съ рожка. Рожокъ — образецъ нечистоты, кислотности, гнили. Отъ сосокъ развивается молочница, а отъ молока въ рожкахъ съ вѣчно кислымъ запахомъ появляются поносы, истощающіе мало-по-малу дѣтей и сводящіе ихъ преждевременно въ могилу. Только самыя здоровыя дѣтскія натуры изъ крестьянъ выдерживаютъ такой способъ кормленія. Но за то дѣти, остающіяся у крестьянъ въ живыхъ, дѣйствительно крѣпки. Это и нужно крестьянину. Слабый человѣкъ ему не нуженъ. Умри поскорѣе, не обременяй семьи! Крѣпкій — расти на тяжелый крестьянскій трудъ.

Крестьяне не разъ изъявляли мнѣ желаніе употреблять гуттаперчевыя соски, которые можно каждый разъ послѣ кормленія снять со стеклянки и вымыть, вслѣдствіе чего весь рожокъ возможно содержать въ чистотѣ. Только крестьянамъ негдѣ покупать гуттаперчевыхъ сосокъ. Не выписывать же ихъ по почтѣ изъ Петербурга, Москвы или губернскаго города. А въ уѣздномъ городѣ, верстѣ за 40, 50, а отъ нѣкоторыхъ деревень и 60 верстъ, рожки съ сосками дороги и держатся въ ограниченномъ числѣ, именно для городскихъ обывателей. Если-бы рожки стеклянные съ гуттаперчевыми сосками продавались въ деревнѣ, подобно всякому товару, то крестьяне охотно стали бы ихъ употреблять вмѣсто существующихъ, и смертность между дѣтьми отъ болѣзней желудочно-кишечнаго канала могла бы понизиться.

Далѣе, по частотѣ заболѣваемости слѣдуютъ болѣзни глазъ — 20,31%. Эти болѣзни происходятъ отчасти острымъ путемъ, вслѣдствіе попаданія инородныхъ тѣлъ въ глазъ, соломиновокъ или осколковъ колосьевъ во время жатвы, укладки стоговъ, или во время молотбы. Сюда принадлежатъ нѣкоторые конъюнктивиты, а также нѣкоторые кератиты съ послѣдовательными иритами. Большею же частью болѣзни глазъ составляютъ хроническое страданіе, начинаясь трахомою, заворотомъ вѣкъ, паннусомъ, и кончаясь полною потерей всего глаза. Частота же появленія трахомы у нашего крестьянина, находящагося большую часть времени на свободномъ воздухѣ, т.е. въ условіяхъ, мѣшающихъ развитію трахомы, объясняется, по моему мнѣнію, лишь нецѣлесообразнымъ расположеніемъ избъ. Нужно знать, что въ той мѣстности, гдѣ были собраны эти наблюденія, всѣ избы строятся такъ, что входъ въ нихъ непременно проложенъ черезъ скотный дворъ; невозможно попасть въ избу, не пройдя по