

засъхвать струпкы-ты, трѣбува да ся пази, каквото болникъ-тъ да гы не чеше, та да гы подлютъва; ако го сръбятъ и ѣдѣтъ много, то да гы намаже съ прѣсно масло. Ако болникъ-тъ, особено дѣте, е много ослабнѣлъ, трѣбува да ся подкрѣпи съ харнѣ хранѣ, а друго му не трѣбува.

И така отъ казано-то ся разбира, че на сипаницѣ-тъ нѣма другъ лѣкъ, освѣнь да ся прѣвари тя съ *болясване*, сир. да ся присади на дѣтца-та сипаница отъ кравѣ или отъ другъ чловѣкъ болясанъ съ такъвѣ сипаницѣ. Пóгорѣ казахмы, че това сръдство е изнамѣрилъ Дженнеръ, а сега неще да е злѣ да кажемъ нѣчто за кравѣ-тъ сипаницѣ, особено за онѣхъ, отъ коѣто ся зима присадъ (болъ, мая, вакцина); зачтото трѣбува да ся знае, че кравы ся сипѣтъ отъ десятина строя сипаницы, които освѣнь *бѣлѣ-тъ*, както ѣ е нарекълъ Дженнеръ, вси-чкы-ты сѣ пакостливы, ако бы да ся присадыше отъ тѣхъ. Чловѣку — запомнѣте го добрѣ — трѣбува да ся присажда само отъ бѣлѣ сипаницѣ, а тя ся распознава по слѣдующы-ты бѣлѣгы. Крава-та, прѣди да ѣ избіе сипаница по вымя-то, 5—6 прыщкы, чясто прѣживя, рови хранѣ-тъ безъ да ѣде, трепере, и дава слабо и водяво млѣко. По три или пять дни излизать по вымя-то особено по пѣлкы-ты ѣ червеникавы пѣпчесты плескуды, които до 7 дни все наголѣмѣвать и отвъртявать наоколо тъмны синины. Отъ тоя день добытче-то усѣща болѣхъ, та стая немирно, особено кога ся дои. Въ осмый день плескуды-ты ся обръщать на чиркы, пѣлны съ быстрѣ лимфѣ, и добытче-то рукне на огънь. На 9-ый день лимфа-та земе да ся мѣти и найсѣтнѣ ся сгѣсти и стане на гной, който засъхне, та на 14-ый день стане