

у него отъ 6 до 10 чѧса. За такъвъ растопъ, доста ще е да земемъ синь камыкъ, колкото единъ лещникъ, та да го растопишь въ водѫ у единъ голѣмъ чашъ. — Добрѣ е еще, ако ланекъ-тѣ годинъ ти сѣ болѣли бубы-ты отъ тѣхъ болесть или отъ другѫ каквато да была, да си направишь новы полицы и лѣсы, па одъра и самы-ты стѣны на онѣхъ стањ, дѣто сѣ хранены лански-ты бубы, да изжюлиши и измыешь сѣ ягкѣ золѣ (цѣдѣ), или сѣ ягкѣ растопъ отъ синь камыкъ. Тая болесть врѣлѣе повече по южны топлы мѣста, а не толкось по сѣверны и по студены мѣста. Нехайство-то въ храненіе-то, натрупани-ти угрызци отъ листа, помѣсены сѣ всяка вѣчнотѣ, безмѣрна-та влага и горящина у стањ-тѣ, дѣто ся храни, всичко това докарва пѣмного да ся распростре тая болесть.

Вторый строй епидемія по бубы-ты ся познава по едны уканки (плескуды), които ся изсыпять по тѣло-то на бубж-тѣ, и затова тѣхъ болесть наричиятъ *епидемію сѣ уканки* (дамги). Тая епидемія прави найголѣмъ пакость по бубы-ты, и забѣлѣжително е, че зараза-та ѹ сїя намира не само у живы-ты, нѣ и у мрѣтвы бубы, па и у само-то сѣмя; зачто-то сѣ ягкѣ микроскопъ е съглядано по тѣхъ безбройно много еживоинки, облы като яйце и доста прозирни. Тыя тѣбройны животинки разѣдѣть утробж-тѣ на бубж-тѣ, нѣкога веднага, слѣдѣ пръвый и вторый сѣнь, а повечето слѣдѣ найдырній сѣнь. Тая болесть много прихваща; оттова, ако у сѣщж-тѣ стањ ся хранять и здравы бубы, то и тѣхъ ще прихване. Нѣ на тѣхъ епидемію ся излиза на главѣ, ако сѣ исчюпени бубы-ты отъ сѣмя, което изнамѣрихъ да вадять по единъ новъ начинъ, по който нездраво-то сѣмя