

Види, ся, че нѣкои си фамиліи сж прѣдрасположены за тѣж болестъ. По нѣкога тя е епидемическа. Не е доказано да ли прѣхваща, нѣ все е умно да ся привардвать здравы-ты дѣца отъ болны-ты. Студъ-тѣ и най-много влажный студъ и брызгы-ты промѣненія на топлинж-тѣ у въздуха сж главны-ты причины, кои-то докарвать гърло.

Гърло хваща дѣца-та най-много отъ прѣвж-тѣ до осмж-тѣ годинж. Дѣца, що бозажь не ся хващатъ отъ тѣж болестъ толкова, колко-то отбиты дѣца.

По нѣкога прѣди да ся яви гърло хваща дѣте-то два, три или и осмъ дни напрѣдъ, обыкновенна рема нѣ съ прѣгракнжль гласъ и съ прѣдранж кашлицж. Тія бѣлѣзи кога придружывать ремж-тѣ все трѣбува да ся боимъ отъ гърло та да глядамы да го прѣваримъ. Нѣкога пакъ не ся показва отнапрѣдъ никѣвъ бѣлѣгъ, и дѣте-то, кое-то вечеръ-та си лѣгнжло весело, прѣзъ ноцъ-тѣ ся хваща отъ гърло.

Дѣте стиснжто отъ гърло крѣхука; испрьво кашлица-та му е остра, а послѣ става задавена. Гласъ-тѣ испрьво прѣграква, на послѣ съвсѣмъ ся задава, та дѣте-то остая докрай безгласно. Дѣте-то мжчно пойма и ся мжчи; това тегло расте наспротивъ колко-то вирѣе болестъ-та. Измежду кашлицж-тѣ и говореніе-то слуша ся да хѣхре и да му свирѣ, като минува въздухъ-тѣ прѣзъ грѣкляна. Това е единъ отъ лоши-ты бѣлѣгы.

Отъ мжчно-то дышаніе, лице-то подпухва, почервѣява, добыва шяръ крушюмень, очѣ-тѣ слѣзять, бръны-тѣ посинявать, шія-та отичя; жилы-ты подъ гърло-то истягать ся отъ крѣвь-тѣ, искачать на възъ и отъ двѣ-тѣ страны на шіж-тѣ; и глава-та ся прѣмѣта надырѣ.

Хръканіе-шо быва различно; нѣ най-много за забѣлѣжваніе е хръканіе-то при кое-то съ хръколи-ти излизать и малкы трошничкы отъ лѣжевыи ципицы; кога ся явятъ такыва хръколіе не остая вече за двоеніе че болестъ-та е гърлица.

Освѣнь горни-ты бѣлѣгы дѣте-то гори като отъ трескж, кожа-та му е топла и жила-та му біе брьзо и корава.

Тая болестъ трае отъ три до пять дни. Въ рѣдкы случии болестъ-та може да ся обрьне на хроническж та да трае и до три седмицы.

Смръть може да ся случѣ кога кашлица-та бжде ягка