

за да може по-лесно и по-добре да забълбъжия всяко мѣсто на земя-тъ и за да ѝ размира както по нивы-ты прокарвамы бразды и турямы слокове и почкы така също на ума си турямы и по земя-тъ чръты, точки като почкы и бълбъжки за да знаемъ кое мѣсто дѣ е и колко е надалечъ едно мѣсто отъ друго, дѣ има планины, моря и пр.

Това трѣбува да запомните за да разберете това, що-то щѣ Ви кажѣ сега за какъ обыкаля земя-та около слънце-то.

Земя-та обыкаля около слънце-то та прави дългнестѣ обыколкѣ, каква-то е обыколка-та на едно яйце. Изъ тоя пѣтъ земя-та врьви, като да е налъзнѣта на нѣщо та глѣда съ два-та си полюсы все камъ едни точки на небе-то, и иде малко наведена камъ слънце-то. Като врьви така наведено изъ пѣтя си тя дохажда ту съ еднѣ-тъ си половинѣ повече обрънѣта камъ слънце-то, ту съ другѣ-тъ си половинѣ; а оттова излиза, че въ едно врѣмя на сѣвернѣ-тъ половинѣ, ще става по-топло и дни-ти ѝ щѣтъ бѣдѣтъ по-голѣми отъ нощи-ты а въ друго врѣмя на южнѣ-тъ половинѣ ще бѣде по-топло и дни-ти ѝ по-голѣми отъ нощи-ты. И така на всяко мѣсто по земя-тъ не може да бѣде нито все еднакво топло, нито все еднакво студено, нито пакъ нощи-ты и дни-ти все еднакви.

Едно врѣмя прѣзъ годинѣ-тъ — кога-то е намъ зима — земя-та е изврънѣтъ камъ слънце-то така, що-то на южный ѝ полюсъ грѣе и пече повече, а на сѣвернѣ-тъ ѝ половинѣ по-малко; тогава на южнѣ-тъ половинѣ става *лѣто*, а на сѣвернѣ-тъ зима; на южнѣ-тъ половинѣ день-тъ е